

Øjenlægen har ordineret drypning af dit barns øjne med Cyclogyl. Det skal gøres for at sikre, at dit barns øjne er i HVILETILSTAND, når der skal måles om dit barn skal bruge briller og hvor stærke brilleglassene skal være. Til børn er ca. 10 år kan det IKKE gøres på anden måde. Derefter kan det gøres uden hos de fleste.

Cyclogyl dråberne gør, at dit barns syn bliver sløret og øjnene lysfølsomme. Virkningen holder i ca. 6 timer hos de fleste, men hos enkelte holder virkningen helt op til 20 timer.

Børn under 0.5 år: Brug Cyclogyl 0.5%. Dryp dråben direkte ind i øjet. Hvor i øjet er ikke vigtigt, blot I ser dråben ramme øjenæblet. Der skal dryppes 2 gange: Første gang 45 min før undersøgelsen og 2. gang 15 minutter før. Der må kun dryppes 1 dråbe i ad gangen.

Børn over 0.5 år: Brug Cyclogyl 1.0%. Dryp som hos voksne. Én dråbe i hvert øje 30 min. før undersøgelsen.

Cyclogyl er **stærk medicin**, det er derfor det er vigtigt, at du overholder reglen om kun at bruge 1 dråbe ad gangen. Børn kan blive særdeles søvnige af dråberne fordi kan påvirke nervesystemet (hjernen), især hvis du drypper for mange dråber i. Nogle børn kan reagere modsat og blive irritable og urolige. Kontakt øjenlægen eller din læge hvis der sker noget uforudset.

På dagen skal I huske solbriller eller kasket. Dit barn kan godt komme i skole eller institution efter undersøgelsen, men husk at give besked om, at synet er ret påvirket og der kan være besvær med nærarbejde og risiko ved færden i trafik.

Med venlig hilsen
Øjenlægen